

Patientens Navn:

Dato:

Smertevurdering i Kognitive Forstyrrelser (PAIC 15)

Item	Betydning af item	Slet ikke	Mild grad	Moderat grad	Høj grad	Ikke undersøgt
ANSIGTS UDTRYK						
Rynket pande og bryn	Sænker og trækker pande og øjenbryn sammen	0	1	2	3	x
Kniber øjnene sammen	Kniber øjnene sammen. Anspændthed omkring øjnene	0	1	2	3	x
Løftet overlæbe	Overlæben løftes, næsen rykkes muligvis	0	1	2	3	x
Åben mund	Læberne er adskilte, kæben hænger	0	1	2	3	x
Virker anspændt	Udtryk af bekymring og anstrengelse	0	1	2	3	x
KROPS BEVÆGELSER						
Stivhed	stivhed, undgåelse af bevægelser, holder vejret.	0	1	2	3	x
Beskytter	beskytter ramte område, undgår berøring, bevæger sig væk	0	1	2	3	x
Uvillighed	Uvillig til at blive flyttet eller at modtage pleje, ikke samarbejdsvillig	0	1	2	3	x
Gnider	Gnubber eller masserer det ramte område	0	1	2	3	x
Rastløshed	Virker rastløs, vrider hænderne, rokker frem og tilbage	0	1	2	3	x
VOKALISATION						
Anvender smerte relateret ord	Anvender smerterelateret ord som f.eks. "av", "det gør ondt"	0	1	2	3	x
Råber	Anvender et højere toneleje til at udtrykke ord	0	1	2	3	x
Jamre/stønner	laver en dyb, uarticulerede lyd	0	1	2	3	x
Mumler	udtaler ord og/eller lyde utydeligt	0	1	2	3	x
Beklager sig	Udtrykker at være ulykkelig, dårlig, i ubehag og/eller i smerte	0	1	2	3	x
		Regnestykke =				

I hvilken situation har du observeret personen?

- I hvile
- Under dagliglivets aktiviteter, beskriv det:
- Under guidet bevægelse, beskriv det:

