

Nome del paziente:

Data:

# Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC 15)

MOVIMENTI	significato degli items	per niente	leggermente	moderatamente	molto	Punteggio non evidente
<b>MOVIMENTI DEL VOLTO</b>						
<b>Espressione accigliata</b>	Aggrottare le ciglia	0	1	2	3	x
<b>Restringere gli occhi</b>	Occhi ristretti e tensione intorno agli occhi	0	1	2	3	x
<b>Labbro superiore sollevato</b>	Labbro superiore sollevato, il naso potrebbe essere arricciato	0	1	2	3	x
<b>Labbra aperte</b>	Le labbra sono separate, la mascella è lasciata in basso	0	1	2	3	x
<b>Tensione</b>	Il volto esprime preoccupazione o strano	0	1	2	3	x
<b>MOVIMENTI DEL CORPO</b>						
<b>Congelamento</b>	Improvviso irrigidimento, evitamento del movimento, respiro tenuto	0	1	2	3	x
<b>Protezione</b>	Proteggere una zona interessata, o parte del corpo, evitando di toccare o allontanandosi	0	1	2	3	x
<b>Resistenza alla cura</b>	Resistenza quando viene mosso o resistere alla cura, essendo poco collaborativo	0	1	2	3	x
<b>Sfregamento</b>	Sfregare o massaggiare una parte del corpo	0	1	2	3	x
<b>Irrequietezza</b>	Agitandosi, torcendosi le mani, dondolandosi avanti e indietro	0	1	2	3	x
<b>VOCALIZZAZIONI E AZIONI VOCALI</b>						
<b>Uso di parole correlate al dolore</b>	Uso di parole che indicano dolore come, ad es. 'Ai' 'Aia', o 'Che male che fa'	0	1	2	3	x
<b>Urlare</b>	Usare una voce forte o acuta per esprimere suoni	0	1	2	3	x
<b>Gemere</b>	Emettere un suono profondo, disarticolato	0	1	2	3	x
<b>Borbottare</b>	Pronunciare parole o suoni in maniera poco distinta e comprensibile	0	1	2	3	x
<b>Lamentarsi</b>	Definirsi infelici, nel disagio, malati e/o doloranti	0	1	2	3	x
<b>TOTALE=</b>						

## Ha osservato il paziente

- Al riposo
- Durante le attività quotidiane (ADL); se sì, quali
- Durante movimenti guidati; se sì, quali



PAIC - 15

Pain Assessment in Impaired Cognition